

Postępowanie po zabiegu implantacji

Aby rana zagoiła się w sposób prawidłowy, należy:

1. Nie przyjmować pokarmów i napojów w czasie działania znieczulenia (około 2 godzin)
2. Po ustąpieniu znieczulenia można jeść pokarmy, które nie wymagają intensywnego gryzienia. Pokarmy i napoje powinny być zimne lub chłodne.
3. Zaleca się płukanie jamy ustnej 0,2% roztworem chlorheksydyny (**Eludril**) po każdym posiłku. Następnego dnia po zabiegu zaleca się delikatne mycie zębów – nową, miękką szczoteczką.
4. Odpoczywać dobę po zabiegu (wysiłek fizyczny może prowadzić do nadmiernego krwawienia i bólu)
5. Zaleca się nie picie alkoholu i palenia papierosów.

Ból:

Z chwilą ustąpienia znieczulenia pojawia się ból, który łatwo można zlikwidować stosując tabletkę przeciwbólową (**Ibuprofen + Paracetamol**). Po trudnym rozległym zabiegu ból może utrzymywać się nawet do kilkunastu dni.

Obrzęk:

Po zabiegu chirurgicznym może pojawić się obrzęk – nawet do 4-5 dni. Aby mu zapobiec, należy po zabiegu zastosować zimne okłady.